



## В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЁМ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЯ РЕБЁНКА ПРОВОДИТСЯ:

- первая в 3 мес
- вторая — 4,5 мес
- третья — 6 мес

### **Ревакцинация:**

- первая в 18 мес
- вторая — 20 мес
- третья — 6 лет





**У непривитых** или не полностью  
вакцинированных встречается  
только **паралитическая форма с  
развитием парезов и параличей**





## Неспецифическая профилактика:

- регулярное проветривание помещения, влажная уборка дома
- соблюдение личной гигиены — личное полотенце, постельное бельё, посуда
- мытьё рук перед едой
- употребление воды из проверенных источников
- тщательное мытьё овощей и фруктов перед употреблением





**Полиомиелит — острое инфекционное заболевание с поражением нервной системы (спинной мозг).**

**Путь передачи:**

- фекально-оральный при употреблении загрязнённых пищевых продуктов и воды
- воздушно-капельный

Возбудитель – вирус. Источник заражения — больной человек. Болеют в основном дети в возрасте до пяти лет.

**Специфического лечения полиомиелита нет, заболевание можно только предотвратить. ПРОФИЛАКТИКА – ВАКЦИНАЦИЯ.**


  Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики



Поделись информацией  
с друзьями и близкими



## ПОЛИОМИЕЛИТ



Острое инфекционное заболевание с поражением нервной системы (спиной мозг). Полиомиелитом болеют, в основном, дети в возрасте до пяти лет.

**Возбудитель** – вирус.

**Источник заражения:** больной человек.

**Путь передачи:** фекально-оральный при употреблении загрязненной воды и пищевых продуктов, реже воздушно-

капельный. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике, попадает в кровь, распространяясь по организму в органы и ткани: лимфоузлы, селезенку, печень, легкие, сердечную мышцу. В дальнейшем вирус проникает в центральную нервную систему.

**Инкубационный период.** От 4 до 35 дней (в среднем 7-14 дней)

**Клиническая картина.** Полиомиелит с поражением ЦНС чаще проявляется в виде серозного менингита: высокая температура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность мышц шеи. Паралитическая форма встречается только у непривитых или не полностью вакцинированных и характеризуется развитием парезов и параличей. Параличи периферические, вялые, с низким тонусом мышц, снижением или исчезновением сухожильных рефлексов и последующей атрофией мышц

**Лечение.** Специфического лечения полиомиелита нет. Больной подлежит обязательной изоляции на срок не менее 3 недель. При паралитических формах полиомиелита лечение длительное и зависит от периода болезни.

**Осложнения:** острая дыхательная недостаточность, сколиоз, атрофия мышц.

**Профилактика.** 1-я вакцинация ребенка проводится в 3 мес., 2-я - в 4,5 мес., 3-я - в 6 мес., 1-я ревакцинация в 18 мес., 2-я - в 20 мес., 3-я - в 6 лет, в соответствии с Национальным календарем прививок.

С профилактической целью важно проводить регулярное проветривание помещения, влажную уборку дома. Необходимо иметь личное полотенце, постельное белье, посуду, мыть руки перед едой, употреблять воду из проверенных источников, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением

